

Qué hacer durante una sobredosis de opiáceos

Si no se toman como lo indica el médico, los opiáceos pueden poner en riesgo la vida. Sin embargo, se puede salvar la vida de una persona con sobredosis de opiáceos si se administra naloxona y se solicita ayuda médica rápidamente.

Conozca los signos de una sobredosis de opiáceos

Darse cuenta de si una persona está teniendo una sobredosis puede ser difícil. Si no está seguro, lo mejor es tratarlo como si fuera una sobredosis.

Estos son algunos signos y síntomas de una sobredosis de opiáceos:

- Pérdida de consciencia
- Pupilas muy pequeñas
- Cansancio extremo
- Falta de aire
- Respiración lenta o falta derespiración
- Inconsciencia

- Brazos y piernas débiles
- Piel pálida
- Labios y uñas púrpuras
- Falta de respuesta a la voz o al tacto
- Sonidos de dificultad respiratoria o de gorgoteo



Una sobredosis
de opiáceos puede ser
muy peligrosa. Llame al 911
si cree que alguien podría
estar experimentando una
sobredosis. Luego de llamar
al 911, administre naloxona
a la persona.

¿Qué es la naloxona y cómo puede ayudar?

La naloxona es un medicamento que se usa para revertir la sobredosis de opiáceos. Si una persona está teniendo una sobredosis, este medicamento puede ayudarla a que vuelva a respirar. En ocasiones, puede tener efectos secundarios desagradables. A veces, en los casos de sobredosis graves, es posible que deba administrarse varias veces. Es importante consultarle al farmacéutico o al médico cómo y cuándo debe usarse la naloxona.

Apoyo adicional

Estamos aquí para ayudar con herramientas y recursos locales adicionales. Comuníquese con nosotros al **1-877-617-0390 (TTY: 1-877-617-0392).**

Línea Nacional de Asistencia de SAMHSA:

1-800-662-HELP (4357)

www.samhsa.gov/find-help/national-helpline

Localizador de tratamientos de SAMHSA:

www.samhsa.gov/find-treatment



Presentación de la naloxona

La naloxona se comercializa en tres presentaciones: inyectable, autoinyectable y aerosol nasal preenvasado.

Producto	Dosis	Información de uso	Costo
Evzio (y genéricos)	2 mg	Incluye instrucciones de voz. Puede inyectarse en el músculo de la pierna a través de la ropa.	\$\$\$
Naloxone (vial de varios usos)	1 ml (0.4mg/ml)	Se extrae con una aguja y una jeringa. La inyección se coloca en el músculo de la pierna o del hombro.	\$\$
Naloxone (atomizador intranasal de un solo uso)	2 mg	Se arma el dispositivo; luego se inserta en las fosas nasales y se libera el medicamento.	\$
Aerosol nasal Narcan	4 mg	Se inserta en la nariz y se libera el medicamento.	\$\$

Dónde obtener la naloxona

- En la actualidad, muchos oficiales de policía yparamédicos llevan consigo naloxona.
- Su médico puede recetársela.
- Es posible que el farmacéutico pueda proporcionarlela naloxona.

¿Tiene preguntas?

Su médico o farmacéutico pueden responder las preguntas que tenga sobre la naloxona. Es posible que necesite este medicamento si:

- Usted toma opiáceos.
- Alguien a quien conoce toma opiáceos.
- Su hijo u otra persona toman un opiáceo por accidente.
- Usted o alguien a quien conoce tuvieron una sobredosis enel pasado.



Estamos aquí para ayudar con herramientas y recursos locales adicionales. Comuníquese con nosotros al **1-877-617-0390 (TTY: 1-877-617-0392).**